



OVEREENKOMST VAN BEHANDELING IMPLANTOLOGIE

Tandartspraktijk De Lindehoeve Voorschoten, 28-7-2018

Tandarts Bosch plaatst al jaren met uiterste zorg en precisie tandheelkundige implantaten. Desondanks kan het in uitzonderingsgevallen voorkomen dat een behandeling niet volgens verwachting verloopt. Deze overeenkomst is bedoeld om u goed te informeren. Leest u dit s.v.p. zorgvuldig door. Als u naar aanleiding van het onderstaande nog vragen heeft dan beantwoord ik ze graag.

Vorbereiding

Alvorens over te gaan tot een implantaatplaatsing heeft u samen met de tandarts gewerkt aan een optimale uitgangssituatie van uw gebit. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat in de onderkaak 98-99% van deze implantaten goed vast groeit. Voor de bovenkaak geldt een succespercentage van 94-95%. Het goed vastgroeien van implantaten is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals:

- Kwaliteit en hoeveelheid van het kaakbot
- De mondhygiëne van de patiënt en bacterieflora van de mond
- Kwaliteit van parodontium / tandvlees en omringende weefsels
- Ziekten, zoals bv suikerziekte, afweerstoornissen, etc
- Medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik. Roken geeft een 4 x vergroot risico op afstoten!
- Overbelasting door tegenoverliggende tanden of kiezen
- Parafuncties, zoals persen, klemmen of knarsen
- Bestraling in hoofd- en/of halsgebied
- Het zich al dan niet houden aan geadviseerde therapie.

Voorafgaand aan de behandeling wordt u een vragenlijst gegeven zodat de tandarts bekend is met uw medische anamnese.

Aard van de behandeling

Er zal bij u een implantaatschroef worden geplaatst in de onderkaak/bovenkaak. *Neem een half uur voor de ingreep een pijnstiller in, en eventueel de antibiotica volgens voorschrift van de tandarts.*

De operatieve ingreep zal onder normale plaatselijke verdoving plaats vinden. De plaatsing zelf duurt over het algemeen niet lang, maar er wordt ruimschoots de tijd genomen zodat de ingreep goed voorbereid en in alle rust plaats vindt.

Na de ingreep bevindt het implantaat zich onder of net boven het tandvlees. Soms zijn er hechtingen aangebracht die na een week verwijderd moeten worden. De implantaten moeten tussen de 2 en 4 maanden in helen (vastgroeien). Tijdens de vervolgbehandeling vindt er pas esthetiekerstel plaats – het plaatsen van de vaste kroon/brug of een uitneembare prothese.

Vorbijgaande ongemakken

Geringe napijn, zwelling en/of een bloeditstorting (soms ook van de wang en hals) zijn de meest voorkomende ongemakken. U kunt zo nodig iedere 4 uur een pijnstiller innemen (500mg / 1000 mg Paracetamol). Indien dit niet afdoende is neemt u iedere 2 uur een pijnstillers in: 400 mg Ibuprofen om de 4 uur afgewisseld met 500 mg Paracetamol om de 4 uur. Het is over het algemeen niet nodig om langer dan 24 uur pijnstilling te gebruiken.

Nabehandeling

Gedurende een dag of 10 mag u de plek waar geïmplanteerd is niet poetsen. U krijgt eenadvies voor een desinfecterend spoelmiddel mee (Perio-Aid of Corsodyl).

Regelmatige controle door de tandarts en mondhygiëniste en optimale mondhygiëne zijn zeer belangrijk. Om de 2 jaar is het maken van een röntgen overzichtsfoto nodig. Mankementen komen dan in een vroeger stadium naar boven.



Complicaties implantaatplaatsing

Uiteraard stellen we alles in het werk om calamiteiten te voorkomen.

- Symptomen van ontsteking (blijvende kloppende pijn, roodheid, pus, dikke wang) en blijvende gevoelsstoornissen van de tong, lip of kin zijn verschijnselen waarbij u contact opneemt met de (dienstdoende) tandarts.
- Het kan voorkomen dat een implantaat niet vast groeit. Dit gebeurt uiterst zelden met complicaties. Het implantaat moet dan verwijderd worden en na genezing van het bot wordt bijna altijd een nieuw implantaat geplaatst.
- In zeer uitzonderlijke situaties kan bij implanteren een gevoelszenuw worden beschadigd. Dit geneest in de meeste gevallen geheel na enige tijd.
- Als gevolg van overbelasting kunnen elementen waarop dicht gebeten wordt breken. Bij kroon- en brugwerk is de kans op breken groter. Dit is meestal eenvoudig te herstellen.
- Bij uitzonderlijke overbelasting kan het implantaat breken. Het restant dient chirurgisch te worden verwijderd.

Risico

In 3%-5% van de gevallen wordt een implantaat helaas afgestoten. Dit kan binnen een korte tijd of pas na maanden/jaren gebeuren. Peri-implantitis (een aandoening vergelijkbaar met parodontale problemen rondom natuurlijke gebitselementen) kan hier een oorzaak van zijn. Roken blijkt van zeer nadelige invloed op het ontstaan ervan. Peri-implantitis is zeer moeilijk te behandelen. Optimale mondhygiëne en regelmatig professioneel laten reinigen van het gebit met goede bacteriecontrole blijft zeer belangrijk om deze problematiek te voorkomen.

Kosten

U heeft van de tandarts een inschatting van de kosten voor het implantaat gekregen. Deze kosten zijn beraamd conform CTG tarieven. U bent akkoord gegaan met deze beraming.

Implantaatmaterialen worden bij herplaatsen door de fabrikant gedurende 10 jaar als garantie vergoed. Soms is het aanpassen van behandeling of vervanging van onderdelen noodzakelijk. Hiervoor kunnen, afhankelijk van uw polisvoorwaarden zorgverzekeraar, extra kosten aan verbonden zijn.

- Tijdens de ingreep kan blijken dat omstandigheden anders zijn. Bijvoorbeeld minder bot of andere ongunstige voorwaarden. Soms is gelijktijdig, of in verdere behandelsessies, extra aanvulling nodig. Reken op meer kosten en bij uitzondering op een langere behandeltime
- Wanneer het implantaat wordt afgestoten (3%-5% van de gevallen) is geen sprake van garantie van het implantaat, abutment of kroon- en brugwerk. Aan het plaatsen van een eventueel nieuw implantaat zijn normale honorarium- en techniekkosten verbonden.
- Ook op het ontstaan van complicaties zoals bovengenoemd is geen garantie te geven en aan behandeling zijn ook hiervoor vaak extra techniek- en behandelkosten verbonden.

Ik hoop dat u erg lang plezier zult hebben van de implantaten. Indien u akkoord gaat met het hierboven beschrevene verzoek ik u dit exemplaar ondertekend aan ons te retourneren.

Hoogachtend, Hans Bosch, tandarts

Ik geef toestemming mijn persoonsgegevens te gebruiken (privacywet AVG). Voor meer informatie zie <http://www.tandartspraktijkdelindehoeve.nl/privacystatement-gegevensverwerking/>

Ik ben akkoord met bovenstaande informatie.

Naam

Handtekening